




Phyt. 763 ⁿ₌

Weber

Supplement



zu den

Alpenpflanzen

Deutschlands u. der Schweiz

von

J. C. Weber.


DIE
ALPEN-PFLANZEN
DEUTSCHLANDS UND DER SCHWEIZ
IN
COLORIRTEN ABBILDUNGEN NACH DER NATUR UND
IN NATÜRLICHER GRÖSSE

VON
J. C. WEBER.

VIERTER BAND
(BLATT 301—400.)

Supplement
ZUR
ERSTEN UND ZWEITEN AUFLAGE IN DREI BÄNDEN.

MÜNCHEN.
CHRISTIAN KAISER.
1868.



J. C. WEBER

LIBRARY

1841-1842

1841-1842

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF MÜNCHEN

MÜNCHEN

CHRISTIAN KASER

1842

Vorbericht.

Als Nachtrag zu den bereits in zweiter Auflage erschienenen 3 Bändchen Alpenpflanzen Deutschlands und der Schweiz lasse ich hier ein IV. Bändchen in gleicher Ausstattung folgen, welches die Abbildungen der in den ersten drei Bändchen fehlenden Alpenpflanzen enthält.

Mit diesem Supplementband ist das Werk, „Alpenpflanzen Deutschlands und der Schweiz“, so viel mir möglich war vervollständigt, und somit sind alle Gefäßpflanzen der Alpen (Gräser und Futterkräuter ausgenommen) in möglichst getreuen Abbildungen, sammt Angabe der Standorte, in den Händen der Freunde dieses schönen Schmucks der Berge.

Ich hoffe, es werden sowohl die Besitzer der schon vorausgegangenen Bändchen, als auch die Liebhaber und Kenner der Alpenflora überhaupt, diesem Werkchen eine freundliche Aufnahme nicht versagen.

M ü n c h e n, im Frühjahr 1868.

J. C. Weber.

Vierter Band.

Blatt 301—400.

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
Ranunculaceen.		
301	Ranunculus Villarsii DC.	Villars Ranunkel.
302	Aquilégia atrata Koch.	Schwärzliche Akelei.
303	„ pyrenaica DC.	Pyrenäische Akelei.
304	Aconítum Störkianum Rchb.	Störke's Eisenhut.
305	„ variegatum L.	Bunter Eisenhut.
306	„ paniculatum Lam.	Rispiger Eisenhut.
Papaveraceen.		
307	Papáver alpinum L. var. albiflorum Koch.	Weisser Alpenmohn.
Cruciferen.		
308	Árabis stricta Huds.	Steifes Gänsekraut.
309	„ serpyllifolia Vill.	Thymian-Gänsekraut.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Voralpen und Alpen ; Schweiz , Tyrol, Krain, Karstgebirg.	Mai — August. 4
Alpen und Voralpen.	Juni. Juli. 4
Steinige Orte ; Krain, Kärnthen, südl. Tyrol; südl. Schweiz.	Juni. Juli. 4
Gebirgswälder der Alpen und Voralpen.	Juni. August. 4
Alpen und höhere Gebirge in Süd- und Mitteldeutschland.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Höchste Alpen , z. B. Schlern in Tyrol, Zugspitze, Wettersteingebirge in Bayern.	Juli. August. 4
Kalkfelsen; im Canton Genf.]	Mai.
Alpen und Voralpen ; Canton Waadt, Aelener Gebirge.	4 Juni. Juli. ⊙

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
310	<i>Arabis</i> <i>vochinensis</i> Spreng.	Wochein-Gänsekraut.
311	<i>Draba</i> <i>Zahlbruckneri</i> Host.	Zahlbruckner's Hungerblümchen.
312	„ <i>tomentosa</i> Wahlenb.	Wolliges Hunger- blümchen.
313	„ <i>frigida</i> Sauter.	Frost - Hungerblüm- chen.
314	„ <i>Johannis</i> Host.	Johannis-Hunger- blümchen.
315	„ <i>incana</i> L.	Graues Hungerblüm- chen.
316	„ <i>ciliata</i> Scopoli.	Gefranstes Hunger- blümchen.
317	<i>Thlaspi</i> <i>cepeaefolium</i> Koch.	Felsentäschelkraut.
Sileneen.		
318	<i>Dianthus</i> <i>atrorubens</i> All.	Vielblüthige Nelke.
319	„ <i>neglectus</i> Lois.	Hochalpen-Nelke.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Alpentriften; Krain, Oberkärnthen, z. B. Schneeberg.	Juli.
Höchste Granitalpen.	Juni. Juli. 4
Höchste Alpen, z. B. Watzmannscharte.	Juni. Juli. 4
Felsen der hohen Alpen.	Juli. 4
Höchste Granitalpen; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen.	Juli. August. 4
Steinige Orte; Schweiz am Ganterich bei Ruggisberg; Albula in Graubünden; Fassa im südl. Tyrol.	Mai. Juni. ⊙
Felsen; Nord- und Ostseite des Nanas; Einsattlung des Monte magg. in Krain.	Mai. Juni. 4
Felsen; Kärnthen im Rabelthal an den Galmeigruben unter der Vitriolwand; Zermatt im Wallis.	Mai. 2½
Triften der niedrigen Gebirge und Alpen; Wallis und Uri; südl. Tyrol; Littoral.	Juni. Juli. 4
Höchste Alpen der Schweiz, sehr selten; Umbrail in Graubünden, Glarner Alpen gegen Graubünden zu; la Denna im Val di Non, südl. Tyrol.	Juli. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
320	<i>Lychnis Viscaria</i> L.	Lichtnelkenblümchen.
321	„ <i>coronaria</i> Lam.	Kronen-Lichtnelke.
Papilionaceen.		
322	<i>Trifólium pallescens</i> Schreb.	Gelblicher Klee.
323	<i>Oxy'tropis foetida</i> DC.	Stinkender Spitzkiel.
324	„ <i>lapponica</i> Gaud.	Hellröthlicher Spitz- kiel.
325	„ <i>montana</i> DC.	Bergspitzkiel.
326	„ <i>cyanea</i> Bie- berst.	Kornblauer Spitzkiel.
327	<i>Astrágalus leontinus</i> Wulf.	Lienzer Traganth.
328	„ <i>purpureus</i> Lam.	Purpurner Traganth.
329	„ <i>oroboides</i> Horn.	Walderbsen-Tra- ganth.
330	„ <i>vesicarius</i> L.	Blasen-Traganth.
331	„ <i>depressus</i> L.	Felsengehänge - Tra- ganth.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Trockene Hügel und buschige Bergabhänge.	Mai. Juni.
Gebirgige, waldige Orte südl. Schweiz ; südl. Tyrol.	4
	Juni. Juli. ⊙
Triften der Alpen, Pasterze am Grossglockner.	Juli—Septbr.
Höchste Walliser Alpen.	4
	Juli. August.
Walliser Alpen, z. B. Zermatt.	4
	Juli.
Triften der Alpen, Zugspitz in Bayern.	4
	Juli. August.
Triften der Alpen ; im Nikolaithale über dem Dorfe Zermatt.	4
	Juli. August.
Felsige Orte in Krain , Steyermark , Tyrol, Wallis.	4
	Juli. August
Felsige Orte des Schlern und bei Predazzo in Südtirol.	4
	Juli. August.
Grasige Orte der Alpen ; am Rothkogel in Steyermark.	4
	Juli. August.
Steinige Orte in Krain , südl. Tyrol, Graubünden.	4
	Mai. Juni.
Felsige, steinige, sonnige Orte der Alpen in der südl. Schweiz und im südl. Tyrol.	4
	Mai. Juni.

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
332	Astrágalus aristatus L'Heretier	Gegrannter Traganth.
333	„ exscapus L.	Schaftloser Traganth.
334	„ monspessu- lanus L.	Montepellinischer Traganth.
335	Hedysarum obscurum L.	Gebirgs - Hahnenkopf.
336	Órobús variegatus Tenore.	Bunte Walderbse.
337	„ luteus L.	Gelbe Walderbse.

Rosaceen.

338	Geum inclinatum Schleich.	Schmutziggelbe Bene- diktenwurz.
339	Potentilla ambigua Gaud.	Veränderliches Fingerkraut.

Crassulaceen.

340	Rhodíola rosea L	Rosenwurz.
341	Sempervívum Wulfeni Hoppe.	Wulfen's Hauswurz.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Steinige Orte der Alpen im Canton Waadt und Wallis.	Mai. Juni. 5
Wiesen und Sandwälder der Ebene und Vor- alpen; Wallis, Tyrol, Mähren, Böhmen, Thüringen.	Mai. Juni. 4
Grasige Orte der Berge des südl. Tyrol, Grau- bünden, der südl. Schweiz.	April. Mai. 4
Nasse Triften der Alpen und Sudeten; Mäh- rische Gebirge.	Juli. August. 4
Bergwälder; Triest, Görz, Krain, südl. Tyrol.	Juni. Juli. 4
Wälder höherer Gebirge; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Krain, Steyermark.	Mai. Juni. 4
Feuchte Wiesen; höchste Abhänge der Sude- ten, Alpen der Schweiz.	Juni. Juli. 4
Alpen von Wallis; über Zermatt am Mat- terhorn.	Juli. 4
Felsige Orte der Alpen; Vogesen und Sudeten.	Juli. August. 4
Felsen der höchsten Alpen; Tyrol, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
342	Sempervivum Funkii Braun.	Funk's Hauswurz.
343	" Braunii Funk.	Braun's Hauswurz.
Saxifrageen.		
344	Saxifraga Cotyledon L.	Cotyledon-Steinbrech.
345	" elatior M.u.K.	Gekerbter Steinbrech.
346	" patens Gaud.	Ausgebreiteter Steinbrech.
347	" sedoides L.	Sedumartiger Steinbrech.
348	" Fachinii Koch.	Fachini's Steinbrech.
349	" petraea L.	Felsen-Steinbrech.
350	" cernua L.	Nickender Steinbrech.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Alpen von Tyrol, Kärnthen, Salzburg.	Juli. August 4
Felsen der höchsten Alpen; am Grossglockner.	Juli. August. 4
Alpen der Schweiz; Wallis, Tessin, Veltlin, Graubünden.	Juli. August. 4
Felsen; südl. Schweiz, südöstl. Tyrol, Krain, Steyermark.	Juli. August. 4
Ist als Bastard zwischen Sax. caesia u. Sax. alzoides an das gleichzeitige Vorkommen der Stammeltern gebunden.	Juni Juli. 4
Felsen der Alpen; von Tyrol und Salzburg bis Oesterreich.	Juli. August. 4
Südöstl. Tyrol; auch auf dem höchsten Kamme der Seiseralpe; auf dem Plattkofel der Seiseralpe gegenüber; auf dem Rosengarten und der Alpe Contria in Fassa.	Juli. August. 4
Felsige Orte; Krain, südl. Tyrol.	Juni.
Bewässerte Felsen der Alpen; Berner Alpen bei Sanen, Wallis über Lenz und Bellalui, Eisenhut in Steyermark, Mölthaler Alpen und Grossfragant in Kärnthen.	Juli. August. 4

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
351	<i>Saxifraga nivalis</i> L.	Schneesteinbrech.
Umbelliferen.		
352	<i>Hacquetia Epipactis</i> DC.	Helleborenblume.
Compositen.		
353	<i>Adenostyles hybrida</i> DC.	Bastard-Drüsen- griffel.
354	„ <i>leucophylla</i> Rchb.	Weissfilziger Drüsen- griffel.
355	<i>Homogyne sylvestris</i> Cassin.	Wald-Homogyne.
356	<i>Gnaphalium Hoppea-</i> <i>num</i> Koch.	Hoppe's Ruhrkraut.
357	<i>Artemisia mutellina</i> Vill.	Edelraute.
358	„ <i>spicata</i> Wulf.	Aehriger Beyfuss.
359	<i>Achillea atrata</i> L.	Schwarzkelchige Schaafgarbe.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsen der kleinen Schneegrube der Sudeten.	Juli. 4
Wälder der Voralpen und Gebirge; Kärnthen, Krain, Mähren, Steyermark, südöstl. Sudeten; Schweiz am Grossen Bernhardt.	April. Mai. 4
Alpen von Wallis und Graubünden.	August. 4
Höchste Walliser Alpen; im Nikolaithale über Zermatt.	August. 4
Wälder der Voralpen in Kärnthen, Krain und Steyermark.	Mai. Juni. 4
Alpen, Voralpen und höhere Mährische, Schle- sische Gebirge und Erzgebirg.	Juli. August. 4
Sonnige Felsen der höheren Alpen.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung.	
	Lateinisch.	Deutsch.
360	<i>Anthemis montana</i> L.	Berg-Anthemis.
361	<i>Arónicum scorpioides</i> Koch.	Geöhrktes Schwindel- kraut.
362	<i>Cineraria alpestris</i> Hoppe.	Voralpen-Aschen- kraut
363	„ <i>aurantiaca</i> Hoppe.	Goldgelbes Aschen- kraut.
364	<i>Senécio abrotanifolius</i> L.	Wohlriechendes Greis- kraut.
365	<i>Leóntodon croceum</i> Hänke.	Safranfarbiger Lö- wenzahn.
366	<i>Mulgedium Plumieri</i> DC.	Grosse Gänsedistel.
367	<i>Crepis incarnata</i> Tausch.	Fleischfarbiger Pippau.
368	„ <i>aurea</i> Casin.	Goldgelber Pippau.
369	<i>Soyéria hyoseredifolia</i> Koch.	Alpen-Soyerie.
370	<i>Hierácium alpinum</i> L.	Alpen-Habichtskraut.
371	„ <i>albidum</i> Vill.	Weissgelbes Ha- bichtskraut.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Alpen von Steyermark.	August. Sept. 4
Kiesige, felsige Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Voralpen in Oestreich, Steyermark, Tyrol, Kärnthen, Krain.	Mai. Juli. 4
Alpen und Voralpen in Kärnthen, Steyermark, Böhmen.	Mai. Juli. 4
Alpen und Voralpen.	Juli. August. 4
Triften der Alpen; höhere Berge des Schwarzwaldes und der Vogesen.	Juli. August. 4
Schattige Orte der Voralpen; westliche Schweiz; Hoheneck und Ballons der Vogesen.	Juli. August. 4
Voralpen und Gebirge; südl. Tyrol, Krain, Kärnthen.	Mai. Juni. 4
Alpen und Voralpen.	Juli. August. 4
Höchste Alpen; Schweiz, Vorarlberg, Obersteyermark.	Juli. August. 4
Triften der Alpen, Voralpen und der höheren Gebirge.	Juni. Juli. 4
Felsige Orte der Alpen, Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Hoheneck der Vogesen.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
Campanulaceen.		
372	Campánula carnica Schied	Krainer Glocken- blume.
373	„ rhomboida- lis L.	Rautenförmige Glockenblume.
374	„ Raineri Perpent.	Rainer's Glocken- blume.
Ericineen.		
375	Rhododéndron interme- dium Tausch.	Mittlerer Alpenbal- sam.
Gentianeen.		
376	Chlora perfoliata L.	Bitterling
377	Gentiana Thomasii Hall fil.	Thomas Enzian.
378	„ Charpentieri Thomas.	Charpentier's Enzian.
379	„ Gaudiniana Thomas.	Gaudin's Enzian.
380	„ Burseri Lap.	Burser's Enzian.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Felsenspitzen der Krainer Alpen.	Juni. Juli. 4
Voralpen und Berge; in der Schweiz nicht selten, im Jura überall.	Juli. August. 4
An felsigen Orten im Canton Tessin.	Juli. August. 4
Zwischen den Stammeltern <i>Rh. ferrug.</i> und <i>hirsutum</i> .	Juni—August. h
Torfige feuchte Orte in Süd- und Mitteldeutschland.	Juli. August. ⊙
Bastard der <i>G. purpurea</i> und <i>G. lutea</i> : mit den Stammeltern.	Juli. August. 4
Bastard zwischen <i>G. punctata</i> und <i>G. lutea</i> .	Juli. August. 4
Bastard zwischen <i>G. punctata</i> und <i>G. purpurea</i> .	Juli. August. 4
Pyrenaeen; an Felsen bei den Bädern von Valdieri in Piemont.	Juli. August. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
Rhinanthaceen.		
381	<i>Pedicularis fasciculata</i> Bellardi	Bündelblüthiges Laüsekraut.
382	" <i>Barelieri</i> Rchb.	Barelier's Laüse- kraut.
383	" <i>comosa</i> L.	Geschopftes Laüse- kraut.
384	" <i>acaulis</i> Scop.	Stengelloses Laüse- kraut.
385	<i>Bartsia alpina</i> L.	Alpen-Bartise.
Lentibularieen.		
386	<i>Pinguicula</i> 1) <i>alpina</i> L.	Alpenfettkraut. (Blume weiss).
	2) <i>P. vulgaris</i>	Gemeines Fettkraut. (Blume blau).
Primulaceen.		
387	<i>Androsace Heerii</i> He- getsch.	Heer's Mannschild.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Alpen und Voralpen; Berg Fedai in Primiero und über dem Wirthshause Braccon in Tessino, südl. Tyrol, Monte Generoso im Canton Tessin.	Juli. August. 4
Berner Alpen.	Juli. August. 4
An der Grenze zwischen den Tyroler und Veronesischen Alpen.	Juni—August. 4
Feuchte, sonnige Abhänge unter Gesträuch; Krain, Südtirol.	April. Mai. 4
Wiesen und Kies der Alpen, mit den Flüssen in den Ebenen; Sudeten, Schwarzwald.	Juli. August. 4
Moosige Wiesen der Alpen und Voralpen, in die Ebenen hinabsteigend.	April. Mai.
Torfige Wiesen.	⊙ Mai. Juni. 4
Alpen des Kleinthales, Canton Glarus gegen das Martinsloch in der Höhe von 7—8000 Fuss.	Juli. August. 4

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
388	Andrósace Charpentieri Heer.	Charpentier's Manns- schild.
389	„ Hausmannii Leybold.	Hausmann's Manns- schild.
390	„ Wulfenii Sieber.	Wulfen's Manns- schild.
391	„ obtusifolia All.	Sumpfbblätteriger Mannsschild.
392	„ carnea L.	Fleischfarbiger Mannsschild.
393	Prímula rhaetica Gaud.	Rhaetische Primel.
394	„ latifolia Lap.	Breitblättrige Primel.
395	„ Wulfenii Schott.	Wulfen's Primel.
396	„ ciliata Schrank.	Gefranste Primel.
397	„ Allionii Lois	Allioni's Primel.
398	Soldanélla montana Willd.	Bergdrottelnblume.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Hochalpen der Schweiz.	Juli. August. 4
Tyroler Alpen; Kirschbaumer Alpe bei Lienz, Schlern, Rosengarten bei Bozen.	Mai. Juni. 4
Hochalpen in Steyermark; auf den Alpen von Flattnitz und Reichenau in Oberkärnthen.	Juli. August 4
Felsen der Alpen und Schneegrube der Sudeten.	Juni. Juli. 4
Granitfelsen; Ballon der Vogesen, Alpen der Schweiz (Tyrol?).	Juli. August. 4
Alpen von Graubünden.	Juni. Juli. 4
Alpen der Schweiz.	Juni. Juli. 4
Auf den höchsten Kalkalpen der Südkette Oesterreichs, Grintanz in Krain.	Mai. Juni. 4
Felsen der höheren Alpen.	Mai. Juli. 4
Kalkfelsen auf dem Berge Castellazo di Paneveggio in Fiemme (Fleimserthal) und von da östlich, an der obersten Baumgrenze.	Juni. 4
Torfige moorige Orte; Gebirge und Voralpen; Salzburg, Oesterreich, Steyermark, Böhmen.	Mai—Juli. 4

Blatt	Benennung	
	Lateinisch.	Deutsch.
399	Cyclámen hederifolium Ait.	Epheublättrige Erd- scheibe.
Empetreae.		
400	Émpetrum nigrum L	Rauschbeere.

Standort.	Blütezeit und Vegetationsdauer.
Felsige Orte im Wallis.	Sept. Oct. 4
Felsige feuchte Orte der Alpen und höheren Gebirge und Brücher des nördlichen Gebirges.	April. Mai. 5

Standard Temperature Scale	
8th May 1881	Standard Temperature Scale
April 1st 1881	Standard Temperature Scale



Ranunculus Villarsii.

Villars Ranunkel.

6]:: [əx] ke
[əx] k6



Aquilegia atrata.

Schwärzliche Akelei.



Aquilegia pyrenaica.

Pyrenäische Akelei.





Aconitum Stoerkianum.

Störke's Eisenhut.



Aconitum variegatum.

Bunter Eisenhut



Aconitum paniculatum.

Rispiger Eisenhut. A · Ei

FEIT · E

1895

1895



Papaver alpinum.

Alpen-Mohn.



Arabis stricta.

Steifes Gänsekräut.



Arabis serpyllifolia. Thymian-Gänsekraut.



Arabis vochinensis.

Wochein - Gänsekraut



Draba Zahlbruckneri.

Zahlbruckner's Hungerblümchen.



Draba tomentosa.

Wolliges Hungerblümchen 1901





Draba frigida.

Frosthungerblümchen. 1791





Draba Johannis.

Johannis-Hungerblümchen.





Draba ciliata.

Gefranstes Hungerblümchen.



Draba incana.

Graues Hungerblümchen.





Thlaspi cepeaefolium.

Felsentäschelkraut.



Dianthus atrorubens.

Vielblüthige Nelke. *fl. e. Nes*





Dianthus neglectus.

Hochalpennelke. Linné III



Lychnis Viscaria.

Lichtnelkenblümchen. *ppiii(danp)*



Lychnis Coronaria.

Kronen-Lichtnelke.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or date.



Trifolium pallescens.

Gelblicher Klee.

1878

Printed and Published by
J. H. B. & Co. 100 N. 3rd St. St. Louis, Mo.



Oxytropis foetida.

Stinkender Spitzkiel.



Oxytropis lapponica.

Hellröthlicher Spitzkiel.





Oxytropis montana.


Bergspitzkiel.





Oxytropis cyanea.

Kornblauer Spitzkiel.





Astragalus leontinus.

Lienzer Traganth.





Astragalus purpureus.

Purpurner Traganth. 101 T

I II 101 I





Astragalus oroboides.

Walderbsen-Traganth.



Astragalus vesicarius.

Blasen - Traganth.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or date.



Astragalus depressus.

Felsengehänge - Traganth.



Astragalus aristatus.

Gegrannter Traganth.





Astragalus exscapus.

Schaffloser Traganth. 1961





Astragalus monspesulanus. Montpellinischer Tragant⁷



Hedysarum obscurum. Gebirgs - Hahnenkopf.





Orobus variegatus.

Bunte Walderbse.

Walderbse



Orobus luteus.

Gelbe Walderbse.



Geum inclinatum.

Schmutziggelbe Benediktenwurz



Potentilla ambigua.

Veränderliches Fingerkraut



[Faint, illegible handwritten text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



Rhodiola rosea.

Rosenwurz.



Sempervivum Wulfeni.

Wulfen's Hauswurz.



Sempervivum Funkii.

Funk's Hauswurz.



Sempervivum Funkii.

Funk's Hauswurz.



Sempervivum Braunii.

Braun's Hauswurz.

HO



Saxifraga Cotyledon.

Cotyledon-Steinbrech

non-S

W-7-UOW-7



Saxifraga elatior.

Gekerbter Steinbrech.





Saxifraga patens. Ausgebreiteter Steinbrech



Saxifraga sedoides.


Sedumartiger Steinbrech St

Steinbrech St



Saxifraga fachinii.

Fachini's Steinbrech. 1918 Stein





Saxifraga petraea.

Felsen - Steinbrech. 1912 S.



Saxifraga cernua.

Nickender Steinbrech.



Saxifraga nivalis.

Schneesteinbrech.

351. 351. 351.



Hæquetia Epipactis.

Helleborenlume.




Adenostyles hybrida.

Bastard-Drüsengriffel. züüse



Adenostyles leucophylla. Weißfilziger Drüsengriff





Homogyne sylvestris.

Wald-Homogyne.





Gnaphalium Hoppeanum.

Hoppe's Ruhrkraut. JTK



Artemisia mutellina.


Edelraute.



Artemisia spicata.

Aehriger Beyfufs.

19/er





Achillea atrata.

Schwarzkelchige Schaafgarbe.



Anthemis montana.

Berg - Anthemis.



Aronicum scorpioides.


Geöhrktes Schwindelkraut, Linde.





Cineraria alpestris.


Voralpen-Aschenkraut.





Cineraria aurantiaca.


Goldgelbes Aschenkraut






Senecio abrotanifolius.

Wohlriechendes Greiskraut





Leontodon croceum. (Haenke.) Saffianfärbiger Löwenzahn.





Mulgedium Plumieri.

Grosse Gänsedistel.

an dän



Crepis incarnata.

Fleischfarbiger Pippau. I III



Crepis aurea.

Goldgelber Pippau.





Soyeria hyoseridifolia.

Alpen - Soyerie.





Hieracium alpinum.


Alpenhabichtskraut.

Platzkr.





Hieracium albidum. Weißgelbes Habichtskraut



Campanula carnica.

Kraimer Glockenblume.

maxenb.




Campanula rhomboidalis. Rautenförmige Glockenblume



Campanula Raineri.

Rainer's Glockenblume.





Rhododendron intermedium. Mittlerer Alpenbalsam.



Chlora perfoliata.

Bitterling.



Gentiana Thomasii. (sec. Rdb.) Thomas Enzian.



Gentiana Charpentieri. (sec. Rchb.)

Charpentier's Enzian. 218



Gentiana Gaudiniana. (sec. Rchb.)

Gaudin's Enzian. 2 mm's



Gentiana Burseri. (sec. Rchb.)


Burser's Enzian.

2121's 2121

12 S.1212 S.1212



Pedicularis fasciculata. Bündelblüthiges Läusekraut





Pedicularis Barelieri.

Barelier's Läusekraut.

bei Länd





Pedicularis comosa L.

Geschöpftes Läusekraut



Pedicularis acaulis L.

Stengelloses Läusekraut




Bartsia alpina.

Alpen - Bartsie.



Pinguicula alpina et vulgaris. Gemeines und Alpenfettkraut





Androsace Heerii. (sec. Rchb.)

Heer's Mammsschild. *miss*





Androsace Charpentieri. (sec. Rchb.) Charpentier's Mammschild.





Androsace Hausmannii. (sec. Rchb.)

Hausmann's Mannsschild

1852



1852


1852



Androsace Wulfenii. (sec. Rchb.)

Wulfens Mannsschild.

2211550





Androsace obtusifolia.

Stumpfblättriger Mannsschild





Androsace carnea.

Fleischfarbiger Mannsschilbann





Primula rhaetica.

Rhaetische Primel. 14 : Prim



Primula latifolia.

Breitblättrige Primel. : PR



1892

1892



Primula Wulfenii.(sec.Rchb.)

Wulfen's Primel.



Primula ciliata.(Schrank.)

Gefranste Primel.



Primula Allionii.

Allioni's Primel.



Soldanella montana.

Bergdrottelnblum

Stell
61919161



Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom left of the page.

Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom right of the page.



Cyclamen Lederifolium. Epheublättrige Erdschei



Empetrum nigrum.

Rauschbeere.



I. Uebersicht der Ordnungen.

Ranunculaceen	Blatt 301—306.
Papaveraceen	„ 307.
Cruciferen	„ 308—317.
Sileneen	„ 318—321.
Papilionaceen	„ 322—337.
Rosaceen.	„ 338—339.
Crassulaceen	„ 340—343.
Saxifrageen	„ 344—351.
Umbelliferen	„ 352.
Compositen	„ 353—371.
Campanulaceen	„ 372—374.
Ericineen.	„ 375.
Gentianeen	„ 376—380.
Rhinanthaceen	„ 381—385.
Lentibularieen	„ 386.
Primulaceen	„ 387—399.
Empetreen	„ 400.

II. Lateinisches Register.

	Blatt		Blatt
<i>Achillea atrata</i>	359	<i>Astragalus aristatus</i>	332
<i>Aconitum paniculatum</i>	306	„ <i>depressus</i>	331
„ <i>Störkianum</i>	304	„ <i>exscapus</i>	333
„ <i>variegatum</i>	305	„ <i>leontinus</i>	327
<i>Adenostyles hybrida</i>	353	„ <i>monspessu-</i>	
„ <i>leuco-</i>		„ <i>lanus</i>	334
„ <i>phylla</i>	354	„ <i>oroboides</i>	329
<i>Androsace carnea</i>	392	„ <i>purpureus</i>	328
„ <i>Charpen-</i>		„ <i>vesicarius</i>	330
„ <i>tieri</i>	388	<i>Bartsia alpina</i>	385
„ <i>Hausmanii</i>	389	<i>Campanula carnica</i>	372
„ <i>Heerii</i>	387	„ <i>Raineri</i>	374
„ <i>obtusifolia</i>	391	„ <i>rhomboid-</i>	
„ <i>Wulfenii</i>	390	„ <i>dalis</i>	373
<i>Anthemis montana</i>	360	<i>Chlora perfoliata</i>	376
<i>Aquilegia atrata</i>	302	<i>Cineraria alpestris</i>	362
„ <i>pyrenaica</i>	303	„ <i>aurantiaca</i>	363
<i>Arabis serpyllifolia</i>	309	<i>Crepis aurea</i>	368
„ <i>stricta</i>	308	„ <i>incarnata</i>	367
„ <i>vochinensis</i>	310	<i>Cyclamen hederifolium</i>	399
<i>Aronicum scorpioides</i>	361	<i>Dianthus atrorubens</i>	318
<i>Artemisia mutellina</i>	357	„ <i>neglectus</i>	319
„ <i>spicata</i>	358	<i>Draba ciliata</i>	315

	Blatt		Blatt
Draba frigida	313	Pedicularis comosa	383
„ incana	316	„ fascicu-	
„ Johannis	314	„ lata	381
„ tomentosa	312	Pinguicula alpina	386
„ Zahlbruckneri	311	„ vulgaris	386
Empetrum nigrum	400	Potentilla ambigua	339
Gentiana Burseri	380	Primula Allionii	397
„ Charpentieri	378	„ ciliata	396
„ Gaudiniana	379	„ latifolia	394
„ Thomasii	377	„ rhaetica	393
Geum inclinatum	338	„ Wulfenii	395
Gnaphalium Hoppea-		Ranunculus Villarsii	301
„ num	356	Rhodiola rosea	340
Hacquetia Epipactis	352	Rhododendron inter-	
Hedysarum obscurum	335	„ medium	375
Hieracium albidum	371	Saxifraga cernua	350
„ alpinum	370	„ Cotyledon	344
Homogyne sylvestris	355	„ elator	345
Leontodon croceum	365	„ facchinii	348
Lychnis coronaria	321	„ nivalis	351
„ viscaria	320	„ patens	346
Mulgedium Plumieri	366	„ petraea	349
Orobus luteus	337	„ sedoides	347
„ variegatus	336	Sempervivum Braunii	343
Oxytropis cyanea	326	„ Funkii	342
„ foetida	323	„ Wulfeni	341
„ lapponica	324	Senecio abrotanifolius	364
„ montana	325	Soldanella montana	398
Papaver alpinum	307	Soyeria hyoseridifolia	369
Pedicularis acaulis	384	Thlaspi cepeaefolium	317
„ Barelieri	382	Trifolium pallescens	322

III. Deutsches Register.

- Akelei, pyrenäische 303. Schwärzliche 302.
Alpenbalsam, mittlerer 375.
Anthemis, Berg-Anthemis 360.
Aschenkraut, goldgelbes 363. Voralpen- 362.
Bartsie 385.
Benediktenwurz, schmuziggelbe 338.
Beyfuss, ähriger 358.
Berganthemis 360
Bitterling 376.
Drottelflume, Berg- 398.
Drüsengriffel, Bastard- 353. Weissfilsiger 354.
Edelraute 357.
Eisenhut, bunter 305. Rispiger 306. Stör-
ke's 304
Enzian, Burser's- 380. Charpentier's- 378. Gau-
din's- 379. Thomas- 377.
Erdscheibe, epheublättrige 399.
Fettkraut, Alpen- 386. Gemeines 386.
Fingerkraut, veränderliches 339.
Gänsedistel, grosse 366.
Gänsekraut, steifes 308. Thymian- 309. Wo-
chein- 310.
Glockenblume, Krainer- 372. Rainer's 374.
rautenförmige 373.

- Greiskraut, wohlriechendes 364.
 Habichtskraut, Alpen- 370. Weissgelbes 371.
 Hahnenkopf, Gebirgs- 335.
 Hauswurz, Braun's- 343. Funk's- 342. Wul-
 fen's- 341.
 Helleborenbiume 352.
 Homogyne, Wald- 355.
 Hungerblümchen, Frost- 313. Gefranstes 315.
 Graues 316. Johannis- 314. Wolliges 312. Zahl-
 bruckners- 311
 Klee, gelblicher 322.
 Läuschkraut, Barelir's- 382. Bündelblüthiges
 381. Geschopftes 383. Stengelloses 384.
 Lichtnelkenblümchen 320. Kronen- 321.
 Loewenzahn, safranfärbiger 365.
 Mannsschild, Charpentier's- 388 Fleischfarbi-
 ger 392. Hausmann's- 389 Heer's- 387. Stumpf-
 blättriger 391. Wulfen's 390.
 Mohn, Alpen- 307.
 Nelke, Hochalpen- 319. Vielblüthige 318.
 Pippau, fleischfarbiger 367. Goldgelber 368.
 Primel, Allionis- 397 Breitblättrige 394. Ge-
 franste 396. Rhätische 393. Wulfen's- 395.
 Ranunkel, Villars- 301.
 Rauschbeere 400.
 Rosenwurz 340.
 Ruhrkraut, Hoppe's 356.
 Schaafgarbe, schwarzkelchige 359.
 Schwindelkraut, geöhrktes 361.
 Soyeria, Alpen- 369.

S p i t z k i e l, Berg- 325. Hellröthlicher 324. Korn-
blauer 326. Stinkender 323.

S t e i n b r e c h, ausgebreiteter 346. Cotyledonen 344.
Facchinis 348. Felsen- 349. Gekerbter 345.
Nickender 350. Schnee- 351. sedumartiger 347.

T r a g a n t h, Blasen- 330. Felsengehänge- 331. Ge-
grannter 332. Lienzer 327. Montpellinischer 334.
Purpurner 328. Schaftloser 333. Walderbsen- 329.

T ä s c h e l k r a u t, Felsen- 317.

W a l d e r b s e n, bunte 336. Gelbe 337.

In der J. Lindauer'schen Buchhandlung in
München erscheint:

Wegweiser
d u r c h S ü d b a i e r n ,
das nördliche und mittlere
T i r o l
und die angrenzenden Theile
von
Salzburg.

Mit steter Rücksicht auf das practische Bedürfniss
des Touristen, insbesondere des Hochgebirgs-
wanderers

von
Ch. Trautwein.

Zweite umgearbeitete und erweiterte Auflage.

Mit Karte, geb. Preis ca. 1 Thlr.

Hat schon die erste Auflage sich rasch die
Gunst der Touristen erworben, so darf diese zweite
wohl auf eben so günstige Aufnahme rechnen, um so
mehr, als diesmal ausser den Nord-Alpen (vom Bo-
densee bis gegen Steiermark) auch die Centralalpen

in ihren Hauptgruppen (besonders Hohe Tauern und Oetzthaler Gebirgsgruppe), dann einzelne Theile der Südalpen (Ortlergruppe, Dolomiten von Fassa etc.) ausführlicher behandelt sind.


Zugleich wird hier — wenigstens in der handlichen Form eines Reisehandbuchs zum ersten Mal — versucht, eine Zusammenstellung der Daten zu geben, welche in den Publicationen des Oesterreichischen Alpen-Vereins, in den Schriften eines S o n k l a r, R u t h n e r, P a y e r und Anderer niedergelegt sind; ausserdem wurden dem Verfasser schriftlich und mündlich eine Menge dankenswerther Mittheilungen zu Theil, welche er nächst der eigenen Erfahrung verwendet hat, und fand natürlich die ältere Literatur, nächst ihr aber vor Allem S c h a u b a c h's classisches Werk, diese Grundlage aller neueren Alpenforschung, eingehende Berücksichtigung.

Nur durch Beiseitelassen alles Nebensächlichen und Phrasenhaften war es möglich, den Stoff auf den geringen Raum von ca. 15 Bogen zusammenzudrängen und dabei neben den gewöhnlichen Reisetouren eine Reihe von Berg- und Gletscherwanderungen zu bringen, und viele, bis jetzt wenig bekannte Thäler aufzunehmen, von denen die meisten Reisehandbücher schweigen.

in the year 1771, the first time
that the name of the
state of New York was
mentioned in the
constitution.

The first time that the
name of the state of New York
was mentioned in the
constitution was in the year
1771, when the name of the
state of New York was
mentioned in the constitution.
The first time that the
name of the state of New York
was mentioned in the
constitution was in the year
1771, when the name of the
state of New York was
mentioned in the constitution.

The first time that the
name of the state of New York
was mentioned in the
constitution was in the year
1771, when the name of the
state of New York was
mentioned in the constitution.
The first time that the
name of the state of New York
was mentioned in the
constitution was in the year
1771, when the name of the
state of New York was
mentioned in the constitution.



Weber, Joseph Carl

Die Alpen-Pflanzen Deutschlands und der Schweiz in colorirten Abbildungen
nach der Natur und in natürlicher Grösse von J. C. Weber. Mit systematisch
geordnetem Text von C. A. Kranz
Bd.: 4

München 1868

Phyt. 763 n-4

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10303854-7